

## ZASADY ZABEZPIECZANIA GOSPODARSTW UTRZYMUJĄCYCH ŚWINIE —

### pozostających poza urzędowymi strefami zagrożenia i występowania ASF



5b

2

3




**1**  
Zakaz obsługi świń przez osoby, które przed upływem 72 godzin uczestniczyły w polowaniu lub odłowieniu zwierząt łownych.

W przypadku utrzymywania świń w systemie otwartym, nakaz budowy podwójnego ogrodzenia wokół wybiegu (wysokość min. 1,5 m), związanego na stałe z podłożem.

Nakaz zabezpieczenia budynków przed dostępem innych zwierząt (osobne, zamknięte pomieszczenia, oddzielne wejścia, bez przejść do pomieszczeń dla innych kopytnych zwierząt gospodarskich).

Nakaz prowadzenia rejestru obecności wszystkich osób w pomieszczeniach, w których utrzymywane są świnię.

Nakaz prowadzenia rejestru wszystkich środków transportu do przewozu świń, wjeżdżających każdorazowo na teren gospodarstwa.



**4**  
Zakaz obsługi świń przez osoby, które wykonują te same czynności w innych gospodarstwach.

Nakaz prowadzenia i aktualizowania spisu świń z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniaki, lochy, loszki, knury i knurki.

**5a**  
Nakaz wyłożenia i stałego utrzymywania mat o długości min. 1 m i szerokości całego wejścia, przed wejściami do pomieszczeń dla świń.

Nakaz stosowania podstawowych środków higieny:  
- mycia i odkażania rąk,  
- czyszczenia i odkażania obuwia, narzędzi i sprzętu,  
- stosowanie oddzielnej odzieży i osobnego obuwia przy obsłudze świń.

Nakaz zabezpieczenia pasz przed dostępem zwierząt.



## **Główny Lekarz Weterynarii przypomina**

Najczęstszym sposobem zakażenia świń wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF) jest bezpośredni, a także pośredni kontakt z zakażonymi świnią i zakażonymi dzikami. Należy jednak pamiętać, że wirus ASF może łatwo rozprzestrzenić się za pośrednictwem osób odwiedzających gospodarstwo, a także poprzez używanie sprzętu i narzędzi skażonych wirusem ASF, jak również za pośrednictwem zwierząt innych niż gospodarskie, mających dostęp do świń (np. gryznie, psy, koty). Do zakażenia świń wirusem ASF może również dochodzić w wyniku skarmiania świń odpadami kuchennymi. Należy również pamiętać, że stosowanie skażonych pasz prowadzi do jego rozprzestrzeniania.

### **Rolniku!**

- nigdy nie kupuj świń niewiadomego pochodzenia
- zabezpieczaj gospodarstwo przed dostępem dzików
- nigdy nie skarmiaj świń odpadami kuchennymi
- nie wprowadzaj na teren gospodarstwa osób postronnych

### **Pamiętaj!**

**Jesteś Sąsiadem, bądź odpowiedzialny!  
Zawsze stosuj zasady higieny w swoim gospodarstwie!**